

**Examenul național de bacalaureat 2021**  
**Proba E. d)**  
**Chimie anorganică**

**Testul 6**

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

**I. TÊTEL**

**(40 punct)**

**A. Tétel**

Az 1-től 10-ig számozott feladatok olyan kémiai anyagokra vonatkoznak, melyeknek vegyi képlete (A)-(F) betűkkel vannak jelölve, az alábbiak szerint:

(A)  $\text{NaOH}$       (B)  $\text{N}_2$       (C)  $\text{NaBr}$       (D)  $\text{H}_2\text{CO}_3$       (E)  $\text{NH}_3$       (F)  $\text{PbO}_2$

Írja a vizsgalapra a feladat sorszáma után a helyes válasznak megfelelő betűjelet! Minden feladatnál egyetlen helyes válasz van.

1. Anyag, melynek molekulájában az atomok háromszoros kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz:

- a. (A)      c. (D)  
b. (B);      d. (E).

2. Az (A) anyag összetételében szereplő nemfémek:

- a. azonos mező elemei;      c. a Periodusos Táblázat azonos csoportjában vannak;  
b. magtöltései azonosak;      d. a Periodusos Táblázat különböző periodusaiban vannak

3. Az (E) anyag:

- a. egy erős bázis;      c. vizes oldatban részlegesen ionizál;  
b. erősebb bázis, mint az (A);      d. vizes oldatban teljes mértékben ionizál.

4. Az (A) anyag:

- a. nem oldódik vízben;      c. nem reagál sósavval;  
b. vízzel heterogén keveréket képez;      d. a nátriumnak vízzel való reakciójával nyerhető.

5. Az (A) anyag vizes oldatába 2-3 csepp fenoltaleint csepegtetve az oldat színe:

- a. kék;      c. kárminvörös;  
b. sárga;      d. élénk ibolya.

6. Az (F) anyag:

- a. az ólomakkumulátor katódja;      c. elhasználódik a Daniell-elem működése során;  
b. a Daniell-elem katódja;      d. az ólomakkumulátor működése során keletkezik.

7. Igaz az alábbi kijelentés:

- a. az (A) nem reagál klórral;      c. a (C) reagál klórral;  
b. a (B) molekulájában két nemkötő elektron van;      d. a (D) erősebb sav, mint a sósav.

8. Ha az (A) anyag vizes oldatának 200 mL-ben 0,02 mol oldott anyag található, akkor:

- a.  $\text{pH} = 3$ ;      c.  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ;  
b.  $\text{pH} = 13$ ;      d.  $[\text{HO}^-] = 0,02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .

9. Anyagmennyiség, mely 4,8 g oxigént tartalmaz:

- a. 0,1 mol (A) anyag;      c. 0,3 mol (F) anyag;  
b. 0,15 mol (F) anyag;      d. 0,6 mol (A) anyag.

10. A szén : oxigén tömegarány a (D) vegyületben:

- a. 1 : 4;      c. 3 : 4;  
b. 4 : 1;      d. 4 : 3.

**30 pont**

**B. Tétel**

Olvassa el az alábbi állításokat! Ha úgy gondolja, hogy az állítás igaz, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát és az I betűt! Ha úgy gondolja, hogy hamis, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát és a H betűt!

1. Az atom tömege az atommagban koncentrálódik.
2. Az alumínium az s mező eleme.
3. Valamely tüzelőanyag égési reakciójának entalpiája negatív.
4. A vas rozsdásodása egy protonátadással végbemenő reakció.
5. A galvánelem sóhídja az oldatok semlegességét biztosítja.

**10 pont**

**II. TÉTEL****(25 pont)****C.Tétel**

1. Egy atom magtöltése +37, nukleonjainak száma pedig 85. Számítsa ki az atom magjában lévő neutronok számát!  
**2 pont**
2. a. Írja le az (E) kémiai elem atomjának elektronkonfigurációját, tudva, hogy 4 alhéja fel van töltve elektronokkal és, hogy az utolsó alhéjon egyetlen elektron található!  
b. Adja meg az (E) kémiai elem helyét (csoport, periódus) a Periodusos Táblázatban!  
**4 pont**
3. a. Modellezze a kémiai kötés kialakulását a nátrium-kloridban, felhasználva a kémiai elemek vegyjeleit és pontokat az elektronok ábrázolására!  
b. Adja meg a klór koordinációs számát a nátrium-klorid kristályrácsában!  
**3 pont**
4. Modellezze a kémiai kötés kialakulását a hidrogénmolekulában, felhasználva a kémiai elem vegyjeleit és pontokat az elektronok ábrázolására!  
**2 pont**
5. Egy mérőlombikban 700 mL 0,5 M koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatot készítenek 100 mL 2 M koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatnak x g nátrium-hidroxiddal és vízzel való összekeverésével. Határozza meg az x értékét!  
**4 pont**

**D.Tétel**

1. A réz és salétromsav között végbemenő reakció egyenlete:  
 $\dots\text{Cu} + \dots\text{HNO}_3 \rightarrow \dots\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \dots\text{NO} + \dots\text{H}_2\text{O}$   
a. Írja le a végbemenő oxidációs, illetve redukciós folyamatok egyenleteit!  
b. Adja meg a salétromsav szerepét (oxidálószer/redukálószer) ebben a reakcióban!  
**3 pont**
2. Határozza meg az 1. pontban megjelenő reakcióegyenlet sztöchiometriai együtthatóit!  
**1 pont**
3. a. Írja le a nátrium-hidroxid és a sósav között végbemenő reakció egyenletét!  
b. Összekevernek 250 mL 0,2 M koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatot 400 mL 0,1 M koncentrációjú sósavoldattal. Határozza meg a keletkezett nátrium-klorid tömegét, grammal kifejezve!  
**6 pont**

**III. TÉTEL****(25 pont)****E.Tétel**

1. a. Az acetilénnek ( $\text{C}_2\text{H}_2$ ) kalcium-karbidból ( $\text{CaC}_2$ ) való előállítás reakciójának termokémiai egyenlete:  
 $\text{CaC}_2(\text{sz}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{f}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{sz})$ . Ezen reakció entalpiaváltozása:  $\Delta_r H^\circ = -127 \text{ kJ}$ .  
Határozza meg a kalcium-hidroxid standard képződési entalpiáját, felhasználva a következő standard képződéshőket:  $\Delta_f H^\circ_{\text{H}_2\text{O}(\text{l})} = -285,8 \text{ kJ/mol}$ ;  $\Delta_f H^\circ_{\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})} = 227 \text{ kJ/mol}$ ;  $\Delta_f H^\circ_{\text{CaC}_2(\text{s})} = -60,4 \text{ kJ/mol}$ .  
b. Adja meg a reakció típusát, figyelembe véve az entalpiaváltozás,  $\Delta_r H^\circ$ , értékét!  
**3 pont**
2. Határozza meg 5 mol acetilén képződésekor felszabaduló hőmennyiséget, kilojouleban kifejezve, az 1a pontban megjelenő reakció szerint!  
**2 pont**
3. Határozza meg azt a víztömeget, kilogrammban kifejezve, mely felmelegíthető  $83^\circ\text{C}$ -ról  $98^\circ\text{C}$ -ra 6270 kJ hő felhasználásával, melyet egy tüzelőanyag égetésével nyertek! Feltételezzük, hogy nem volt hőveszteség.  
**3 pont**
4. Az etén ( $\text{C}_2\text{H}_4$ ) égetési reakciójának egyenlete:  
 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ,  $\Delta_r H^\circ$ .  
Alkalmazza Hess törvényét az etén égési reakciója entalpiaváltozásának meghatározására,  $\Delta_r H^\circ$ , standard körülmények között, felhasználva az alábbi reakciók entalpiaváltozásait:  
(1)  $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$   $\Delta_r H^\circ_1$   
(2)  $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + 7/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$   $\Delta_r H^\circ_2$   
(3)  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$   $\Delta_r H^\circ_3$   
**4 pont**
5. A szén-monoxid égési reakciójának termokémiai egyenlete:  
 $\text{CO}(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\Delta_r H^\circ < 0$ .  
Milyen összefüggés van a szén két oxidjának standard képződési entalpiája között, figyelembe véve az égési reakció entalpiáját?  
**3 pont**

**F.Tétel**

1. A laboratóriumban az oxigénesvíz bontását mangán-dioxid jelenlétében valósítják meg:  
 $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ .  
Adja meg a mangán-dioxid szerepét ebben a reakcióban!  
**1 pont**
  2. Egy  $\text{A} \rightarrow$  termékek típusú reakció esetén megfigyelték, hogy az (A) reagens koncentrációjának megháromszorozódása a reakciósebesség 9-szeres növekedését eredményezi. Határozza meg a reakciórendet!  
**3 pont**
  3. a. Egy zárt térben található gázelegy 2 mol héliumot és 4 g neont tartalmaz  $27^\circ\text{C}$ -on és 22 atm nyomáson. Határozza meg a gázelegy térfogatát, literben kifejezve!  
b. Határozza meg  $18,066 \cdot 10^{22}$  atomot tartalmazó hidrogén-cianid tömegét, grammal kifejezve.  
**6 pont**
- Atomszámok:** H- 1; N- 7; O- 8; Na- 11; Al- 13; Cl- 17.  
**Atomtömegek:** H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Ne- 20; Na- 23; Cl- 35,5; Pb- 207.  $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ .  
**Avogadro-szám:**  $N = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ . **Egyetemes gázállandó:**  $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ .