

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I

(40 de puncte)

A. Tétel

Az 1-től 10-ig számozott feladatok olyan kémiai anyagokra vonatkoznak, amelyek vegyi képlete (A)-(F) betűkkel vannak jelölve az alábbiak szerint:

(A) CuSO_4

(B) N_2

(C) HCl

(D) HCN

(E) NaOH

(F) H_2O

Az alábbi feladatok esetén, írja a vizsgalapra a feladat sorszámát a helyes válasznak megfelelő betűvel társítva! Minden feladatnál egyetlen helyes válasz van.

1. Az (A) vegyületre igaz, hogy:

- a. elhasználdik az ólomakkumulátor működése során; c. elhasználdik a Daniell-elem működése során;
b. képződik az ólomakkumulátor működése során; d. képződik a Daniell-elem működése során.

2. Az az anyag, amelynek molekulái nempoláris kovalens kötésekkel alakulnak ki:

- a. (B); c. (D);
b. (C); d. (F).



3. Az egyik atomnak, amely a (D) anyag molekuláját létrehozza:

- a. a megkülönböztető elektronja a 3s alhéjban van; c. magtöltése +8;
b. négy vegyértékelektronja van; d. három kételektronos pályája van.

4. Az (F) anyag tiszta állapotban:

- a. - 5 °C-on folyadék; c. **nem** rendelkezik elektromos vezetőképességgel;
b. + 5 °C-on szilárd; d. **nem** oldja az (E) anyagot.

5. Figyelembe véve az alábbi reakciók egyenleteit,



igaz, hogy:

- a. a fluornak erősebb nemfémes jellege van, mint **m**-nek; c. az **n** anyag a klór;
b. a magnéziumnak erősebb fémes jellege van, mint **p**; d. a **p** anyag egy nemfém.

6. Igaz, hogy:

- a. (C) gyengébb sav, mint (D); c. (D) vizes oldatban teljes mértékben ionizál;
b. (C) a fenoltaleint vörösre színezi; d. (C) és (E) közötti reakció semlegesítés.

7. Az (A) vegyületben a kén oxidációs száma:

- a. -2; c. +4;
b. 0; d. +6.

8. A (C) vegyület vizes oldatában, amelynek a $\text{pH} = 2$, a hidrónium ionok koncentrációja egyenlő:

- a. $10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; c. $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
b. $10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; d. $12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

9. Egy mol (D) vegyületben van:

- a. 7 g nitrogén; c. $6,022 \cdot 10^{23}$ atom;
b. 6 g szén; d. $6,022 \cdot 10^{23}$ molekula.

10. Az (A) vegyületben a tömegarány:

- a. $\text{Cu} : \text{S} = 1 : 1$; c. $\text{S} : \text{O} = 1 : 1$;
b. $\text{Cu} : \text{S} = 2 : 1$; d. $\text{S} : \text{O} = 2 : 1$.

30 pont

B. Tétel

Olvassa el az alábbi állításokat! Ha úgy gondolja, hogy az állítás igaz, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát és az I betűt. Ha úgy gondolja, hogy hamis, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát és a H betűt.

1. A periódusos rendszer azonos főcsoportjában levő elemek atomjainak ugyanannyi vegyértékelektronja van.
2. A nátrium-klorid kristályrácsának elemi cellája egy kocka.
3. A nátrium és a klór közötti reakció elektroncserével jár.
4. A nátrium-hidroxid oldata vezeti az elektromos áramot.
5. Levegőben a vasat egy tömör és jól tapadó oxidréteg borítja be, amely védi a korrozio ellen. **10 pont**

SUBIECTUL al II-lea

(25 de puncte)

C. Tétel

1. Egy atom vegyértékhéjának elektronkonfigurációja $3s^2 3p^6$. Tudva azt, hogy az atom atommagjában 4 neutronnal több van, mint a protonok száma, határozza meg az atom magjának összetételét (protonok, neutronok). **3 pont**
2. a. Írja le az (E) elem atomjának az elektronkonfigurációját, amelynek 3 elektronja hiányzik ahhoz, hogy 2p alhéja teljesen feltöltött legyen!
b. Írja le az (E) elem atomjában levő egyelektronos pályáinak számát!
c. Írja le az (E) elem helyét a periódusos rendszerben (csoport, periódus)! **5 pont**
3. Modellezze a nátrium ion kialakulását, használva az elem vegyjelét és pontokat az elektronok ábrázolására! **2 pont**
4. Modellezze a nitrogén molekulában kialakuló kémiai kötést, használva az elem vegyjelét és pontokat az elektronok ábrázolására! **2 pont**
5. Összekevernek 200 mL 0,1 M koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatot 3,2 g nátrium-hidroxiddal és desztillált vízzel, miközben 500 mL oldatot nyernek. Határozza meg az így kapott oldat moláris koncentrációját! **3 pont**

D. Tétel

1. A salétromsav vas(II)-szulfáttal reagál. A lejátszódó kémiai reakció egyenlete a következő:
$$\dots \text{HNO}_3 + \dots \text{FeSO}_4 \rightarrow \dots \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \dots \text{H}_2\text{SO}_4 + \dots \text{NO} + \dots \text{H}_2\text{O}.$$

a. Írja le a fenti reakcióban lejátszódó oxidációs, illetve redukciós folyamatok egyenleteit!
b. Írja le az oxidálószer nevét! **3 pont**
2. Írja le az 1. pontban levő reakció sztöchiometrikus együtthatóit! **1 pont**
3. Egy 7 g tömegű, 80%-os tisztaságú felmelegített vasmintát, klórt tartalmazó tartályba helyeznek.
a. Írja le a lejátszódó reakció egyenletét!
b. Számítsa ki a reakcióhoz sztöchiometrikusan szükséges klór térfogatát, literben kifejezve, normál körülmények között mérve! Feltételezzük, hogy a szennyeződések nem reagálnak a klórral. **6 pont**

SUBIECTUL al III-lea

(25 de puncte)


E. Tétel

1. a. Határozza meg az ólom(II)-nitrát standard moláris képződési entalpiáját, figyelembe véve a következő termokémiai reakció egyenletét:
$$2\text{PbO}(\text{sz}) + 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{sz}), \Delta_f H^0 = -598,6 \text{ kJ}.$$

Használja a következő standard moláris képződési entalpiákat: $\Delta_f H^0_{\text{NO}_2(\text{g})} = 33,2 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_f H^0_{\text{PbO}(\text{s})} = -219 \text{ kJ/mol}$!
b. Adja meg a reakció típusát, figyelembe véve a $\Delta_r H^0$ reakcióentalpia értékét! **3 pont**
2. Számítsa ki 0,4 mol ólom(II)-nitrát képződéséhez szükséges hőmennyiséget, kilojoulban kifejezve! Használja az 1.a. alpont adatait. **2 pont**
3. Számítsa ki 10 kg víz, 5 °C-ról 75 °C-ra való felmelegítéséhez szükséges hőmennyiséget, kilojoulban kifejezve! Feltételezzük, hogy nincs hőveszteség. **3 pont**
4. Alkalmazza Hess törvényét az alábbi termokémiai egyenlettel leírt reakció entalpiaváltozásának meghatározására:
$$\text{Zn}(\text{sz}) + \text{C}(\text{sz}) + 3/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{ZnCO}_3(\text{sz}) \quad \Delta_r H^0$$

standard körülmények között, az alábbi termokémiai egyenletekkel leírt reakciók entalpiaváltozásainak függvényében:
$$\begin{aligned} (1) \text{ZnO}(\text{sz}) + \text{CO}_2(\text{g}) &\rightarrow \text{ZnCO}_3(\text{sz}) & \Delta_r H^0_1 \\ (2) \text{Zn}(\text{sz}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) &\rightarrow \text{ZnO}(\text{sz}), & \Delta_r H^0_2 \\ (3) \text{C}(\text{sz}) + \text{O}_2(\text{g}) &\rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) & \Delta_r H^0_3. \end{aligned}$$
 4 pont
5. a. Adja meg annak a reakciónak a típusát, amelynek termokémiai egyenlete a következő:
$$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{Q} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}),$$
 figyelembe véve a környezetével való hőcserét!


b. Az alábbi grafikonok egyikén az **5. a alpontban** levő reakció entalpiaváltozása látható, ahol H_R és H_P a reagensek, illetve a termékek entalpiáját jelenti. Adja meg annak a grafikonnak a sorszámát, amely fenti reakciónak megfelelő entalpiaváltozást ábrázolja!



3 pont

F. Tétel

1. A réz-hidroxidot a réz-szulfátnak nátrium-hidroxiddal való reakciójával állítják elő:




Adja meg a reakció típusát, figyelembe véve annak reakciósebességét!

1 pont

2. Határozza meg, hányszorosára változik a reakciósebesség az $A + B \rightarrow \text{Termékek}$ reakció esetén, abban az esetben, ha az (A) reagens koncentrációja állandó marad, míg a (B) reagens koncentrációja megkétszereződik. A részleges reakciórendek a következők: $n_A = 2$ és $n_B = 1$.

3 pont

3. a. A szén-monoxid égési reakciójának egyenlete a következő:



Számítsa ki az elhasznált oxigén térfogatát, literben kifejezve, 27°C-on és 1 atm-n, amely 5 mol szén-dioxid képződéséhez szükséges!

b. Határozza meg a szén-dioxid tömegét, grammal kifejezve, amely $9,033 \cdot 10^{24}$ atomot tartalmaz!

6 pont

Atomszámok: H- 1; C- 6; N- 7; O- 8; F- 9; Na- 11; Mg- 12; Cl- 17.

Atomtömegek: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Na-23; S- 32; Fe- 56; Cu- 64.

Avogadro-szám: $N = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Móltérfogat (normál körülmények között): $V = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$c_{\text{H}_2\text{O}} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Egyetemes moláris gázállandó: $R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.