

Examenul național de bacalaureat 2021

Proba E. d)
Chimie organică

Testul 10






- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

I. TÉTEL

(40 puncte)

A. Tétel

Az 1-től 10-ig számozott kérdések az (A)-tól (F)-ig betűkkel jelölt szerves vegyületekre vonatkoznak. Ezek szerkezeti képletei a következők:



Mindegyik kérdés esetén írja a vizsgalapra a kérdés sorszámát és mellé a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden kérdésre egyetlen helyes válasz létezik.

1. Ugyanazon szerves funkciós csoportba tartoznak:

- a. (A) és (B);
b. (A) és (D);
c. (D) és (E);
d. (D) és (F).

2. Hidrogénkötéssel vízmolekulákhoz **nem** kapcsolódó molekulájú vegyületek száma:

- a. 1;
b. 2;
c. 3;
d. 4.

3. Igaz, hogy:

- a. az (A) alkohol ecetsavas erjedése aerób folyamat;
b. a 2-butanol dehidratációjakor többségben (B) keletkezik;
c. az (E) két háromértékű funkciós csoportot tartalmaz;
d. az (F) monoaminodikarbonsav.

4. A (C) szénhidrogén a (B) szénhidrogénből előállítható a következő reakcióval:

- a. addíció;
b. izomerizáció;
c. szubsztitúció;
d. transzpozíció.

5. Molekulájukban 6 pár kötésben részt nem vevő elektront tartalmaznak:

- a. (A) és (D);
b. (A) és (E);
c. (D) és (F);
d. (E) és (F).

6. A glutamil-lizin molekulájában található:

- a. két nitrogén atom;
b. két aszimmetrikus szénatom;
c. két szén-oxigén kettős kovalens kötés;
d. két peptid kötés.

7. A (B) szénhidrogén klóraddíciójakor:

- a. keletkezett termék optikailag nem aktív;
b. alkalmazzuk a Markovnyikov szabályt;
c. 2-klór-bután keletkezik
d. a klór szén-tetrakloridban van feloldva.

8. Magas hőmérsékleten a (C) szénhidrogén dehidrogénezésével egy olyan szerves keverék keletkezik, amely a következőket tartalmazza:

- a. két láncizomer alkánt;
b. két homológ alkánt;
c. két helyzeti izomer alként;
d. két homológ alként.

9. Az (F) vegyületben az atomarány:

- a. C : H = 6 : 7;
b. C : O = 1 : 3;
c. N : H = 7 : 1;
d. N : O = 1 : 1.

10. Azonos tömegű hidrogént tartalmaz:

- a. 2 mól (A) vegyület és 1 mól (E) vegyület;
b. 46 g (A) vegyület és 138 (E) vegyület;
c. 1 mól (B) vegyület és 73 g (F) vegyület;
d. 84 g (B) vegyület és 1 mól (F) vegyület.

30 pont

B. Tétel

Olvassa el az alábbi állításokat! Ha úgy gondolja, hogy az állítás igaz, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát, és mellé az I betűt! Ha úgy gondolja, hogy az állítás hamis, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát, és mellé a H betűt!


1. Az azonos molekulaképletű alkánok forráspontjai csökkennek a szénlánc elágazásával.
2. Az etin molekula addíciós reakcióiban π kovalens kötések hasadnak fel.
3. Az akrilnitril és poliakrilnitril százalékos összetétele azonos.
4. A szacharóz $C_{12}H_{22}O_{11}$ molekulaképletű monoszacharid.
5. A 2,3-dimetil-pentán molekulájában két aszimmetrikus szénatom van.

10 pont
(25 pont)

II. TÉTEL

C. Tétel

1. A (H) szénhidrogén szerkezeti képlete:



- Írja le a (H) szénhidrogén egy helyzeti izomerének szerkezeti képletét! **2 pont**
- Írja le az acetilén előállítási reakciójának egyenletét kalcium-karbidból és vízből! **2 pont**
- Egy 56 g tömegű karbid mintát vízzel kezeltek. A reakció során 0,7 mól acetilén keletkezett. Határozza meg a karbid tisztaságát! **3 pont**
- Írja le a n-bután krakkolási reakcióinak egyenleteit! **4 pont**
- Egy krakkolási reaktorba 20 mól n-butánt vezettek. Normál hőmérsékleten és nyomáson mért körülmények között 806,4 L gázelegy keletkezett, amely tartalmaz metánt, etánt, etént, propént sztöchiometrikus mennyiségben és nem reagált n-butánt is. Határozza meg az átalakult n-bután mólszázalékát! **4 pont**

D. Tétel

- Elégettek 5 mól metánt és ismeretlen mennyiségű etánt tartalmazó elegyet. Felszabadult 10689 kJ hő. Tudva azt, hogy egy mól metán égésekor 890,2 kJ hő szabadul fel, és 1 mól etán égésekor 1559,5 kJ hő szabadul fel, határozza meg az etán mennyiségét az elegyben mólban kifejezve! **3 pont**
- Írja le az (I), (II) és (III) átalakulásoknak megfelelő reakcióegyenleteket! Használja a szerves vegyületek szerkezeti képleteit!
(I) acetilén $\rightarrow$ etén (II) etén $\rightarrow$ klór-etán (III) etén $\rightarrow$ polietén. **6 pont**
- Jegyezze le az (I)-es átalakulásnak megfelelő reakcióban használt katalizátort! **1 pont**

III. TÉTEL

(25 pont)

E. Tétel

- 1.a. Írja le a glicerín-trinitrát előállításának reakcióegyenletét glicerínből és nitráló elegyből, felhasználva a szerves vegyületek szerkezeti képleteit!
- b. Egy 230 g tömegű glicerín mintát nitrálóeleggyel kezelnek. A nitráló elegyben a salétromsav és a kénsav molaránya 1 : 3. Határozza meg a kénsav tömegét a nitrálóelegyből, grammal kifejezve! **5 pont**
2. Jegyezze le a glicerín két fizikai tulajdonságát standard körülmények között. **2 pont**
3. Írja le az etanol ecetsavas erjedésének reakcióegyenletét! **2 pont**
4. Határozza meg az etánsav tömegét, grammal kifejezve, amely 8 mól etanol ecetsavas erjedésével keletkezik, tudva azt, hogy a folyamat 75%-os hozammal megy végbe! **3 pont**
5. A fenol nitrálásakor (A) szerves vegyület keletkezett, amelyben a tömegarány N : H = 7 : 1. Határozza meg az (A) szerves vegyület molekulaképletét! **3 pont**

F. Tétel

1. A (P) peptid 2 móljának teljes hidrolízisekor 108 g víz fogyott és keletkezett egy α -alaninból és 450 g glicinből álló elegy.
a. Határozza meg a (P) peptidben levő peptidkötések számát!
b. Számítsa ki a hidrolízis során keletkezett aminosav elegyből az α -alanin mennyiségét, mólban kifejezve! **4 pont**
2. Írja le az **1. pont** (P) peptidének egy lehetséges szerkezeti képletét! **2 pont**

3. a. Îrja le a glükóz és a Fehling reagens között lejátszódó reakció egyenletét! Használja a szerves vegyületek szerkezeti képleteit!

b. Egy 75 mL térfogatú glükóz oldatot fölös mennyiségű Fehling reagenssel kezeltek. Keletkezett 1,08 g réz (I) –oxid. Határozza meg a glükóz oldat moláris koncentrációját! **4 pont**

Atomtömegek: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S- 32; Ca- 40; Cu- 64. **Móltérfogat** (normál körülmények): $V = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.