

Problema 2 - pseudobil

Autor: prof. Constantin Gălățan,
Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița

Cerința 1 (20 puncte)

Se parcurg segmentele orizontale care conțin numai celule în interiorul pătratului.
Se observă că segmentul de lungime maximă are $n_r = D - 1$ celule. Segmentul aflat imediat de deasupra și cel de dedesupt au fiecare câte $(n_r - 2)$ celule. Soluția va fi

$$nr1 = nr + 2 * (nr - 2) + 2 * (nr - 4) + \dots + 2 * 1$$

Cerința 2 (80 de puncte)

Soluție $O(m * n^2)$

Pentru fiecare interogare, se parcurg orizontal toate segmentele formate din celule interioare sau traversate pe diagonală de către laturile pătratului.

Acestă soluție obține **30** de puncte din punctajul cerinței 2.

Soluție $O(m * K)$ (Ciprian Cheșcă)

Se știe că o dreaptă de ecuație $ax+by+c=0$ împarte planul în două semiplane cu proprietatea că toate punctele dintr-un semiplan verifică relația $ax+by+c > 0$ sau $ax+by+c < 0$.

Notând vârfurile cadrului cu ABCD laturile acestuia formează 4 drepte : AB, CD respectiv AD, BC. Putem considera că o bilă se găsește în interiorul cadrului dacă bila se găsește în regiunea pozitivă a semiplanului AB și regiunea negativă a semiplanului CD și analog dacă bila se găsește în regiunea pozitivă a semiplanului AD și regiunea negativă a semiplanului BC.

Calculând în ce semiplan se găsește fiecare bilă în funcție de poziția cadrului se poate deduce dacă bila este în interiorul cadrului sau pe una din laturi.

Acestă soluție obține **30** de puncte din punctajul cerinței 2.


Soluție $O(n^2 + m * n)$

Pentru reducerea complexității la $O(n)$ per interogare, se rețin sumele parțiale pentru fiecare coloană a matricei.

Fie deci matricea a , cu $a[i][j]$ - numărul de bile aflate pe coloana j , până la linia i .

Se parcurge fiecare segment vertical aflat în interiorul cadrului și se calculează numărul de bile ca fiind $a[i_2][j] - a[i_1][j]$ unde i_2 este linia pe care se găsește ultima celulă (cea mai de jos), iar i_1 este linia anterioară primei celule a segmentului.

Acestă soluție obține **60** de puncte din punctajul cerinței 2.



Soluție $O(n^2 + m)$ (Constantin Gălățan)

Se poate răspunde la fiecare întrebare în $O(1)$ dacă se precalculează în $O(n * n)$ sumele parțiale în raport cu diagonalele.

În continuare vom numi diagonală secundară oricare diagonală care e paralelă cu diagonala secundară și vom numi diagonală principală oricare diagonală care e paralelă cu diagonala principală.

Definim matricile: **su**, **sd**, **pu**, **pd** cu semnificațiile:

su[i][j] – numărul de bile aflate deasupra și pe diagonala secundară i, pe coloanele 1..j. (up)

sd[i][j] – numărul de bile aflate sub și pe diagonala secundară i, pe coloanele 1..j. (down)





sp[i][j] – numărul de bile aflate deasupra și pe diagonala principală i, pe coloanele 1..j. (up)

sd[i][j] – numărul de bile aflate sub și pe diagonala secundară i, pe coloanele 1..j. (down)

Diagonalele secundare se numerează 1, 2, ... $2 * n - 1$ începând cu cea de la celula (1, 1)


Diagonalele principale se numerează 1, 2, ... $2 * n - 1$ începând cu cea de la celula (n, 1)

În exemplele de mai jos, **su**[5][4], **pd**[5][4], **sd**[7][5], **pu**[7][5] reprezintă numărul de bile care se găsesc în interiorul zonelor hașurate.



Pentru a afla interiorul cadrului superior în centrul sume și diferențe de puteți gândi la arii și la excluderii.

Prin urmare, acoperit de cadru acoperite) va fi egală suprafețe, din care se poligoanelor marcate albastru:



numărul de bile din plasat cu colțul celulei (x, y), se fac sume parțiale. Vă principiul includerii și

aria poligonului (numărul de bile cu aria întregii scad ariile cu roșu, verde și

Această soluție obține - **80** de puncte, punctajul maxim pentru cerința 2.

Soluție $O(n^2 + m)$ (Eugen Nodea)

Cum putem transforma problema într-o problemă clasică?

Inițial avem o matrice și un cadru pătratic (romb) paralel cu diagonalele matricei.

Dar dacă ”rotim” cu 45° matricea inițială, atunci vom avea un romb în care este inclus un cadru pătrat.

Să privim figura alăturată ce descrie rotația:

inițial	După rotație

Matricea nou creată are $(2*N-1)*(2*N-1)$ elemente.

Astfel problema se reduce la o problemă clasică:

”Pentru o matrice pătratică binară (conține valori de 0 și 1) să se determine numărul de valori de 1 aflate în pătratul (rombul) de latura D, pătrat pentru care se cunoaște colțul dreapta sus”.

Astfel, pentru fiecare interogare se va răspunde în $O(1)$.